

A、Alasan umum untuk injeksi intravena :

1. Demam ◦
2. Muntahan dan diarekasus ◦
3. Makan kesulitan ◦
4. Ketidakseimbangan elektrolit

B、Tujuan terapeutik

1. Dengan perintah diberikan obat antibiotic atau transfuse darah ◦
2. Mengingat cukup elektrolit dan nutrisi air ◦
3. Anak-anak dengan perubahan kondisi yang diamati dan direkam, Dan deteksi dini komplikasi ◦

C、Perawatan panduan

1. Tetap bersih untuk mencegah infeksi pada jarum tetap ◦
2. Jangan menarik jarum untuk mencegah tetesan atau memaksakan perpindahan tetap atau selip ◦

3. Janganlah menindas atau mendistorsi drip tabung infuse untuk menjaga kelancaran ◦
4. Harap dicatat bahwa anak-anak dijemput : jangan melebihi situs pengendali laju alir injeksi dan botol tetes tetes (suntikan tangan rendah) ◦
5. Botol drip ditaati saat tolong bantu mengamati apakah perbedaan ditandai juga ◦
6. Akan diamati di tempat suntikan dan laju alir kebenaran pergeseran dan peduli bantuan perawat silakan ◦
7. Jangan mencoba untuk menyesuaikan jumlah tetes tetes sehingga untuk menghindari menyebabkan pipa beban jantung cepat atau terlalu lambat atau diblokir drip ◦

D、Kewaspadaan :

(Harap memberitahu perawat jika kondisi berikut)

1. Situs jarum perdarahan atau bocor ◦
2. Tempat suntikan Rad、Bengkak、Panas、Sakit dan fenomena pembengkakan ◦
3. Bila tidak menetes tetes ◦
4. Saat hendak menetes botol infuse kosong ◦
5. Jarum slip ◦



Pediatric Instruksi Keperawatan Tunggal Drip

如對護理指導有問題請洽詢
中山醫療社團法人中山醫院
地址：臺北市仁愛路四段112巷11號
電話：(02)2708-1166
103.06 制、112.05 修

現代醫療，傳統照顧