



中山醫療社團法人中山醫院
CHUNG SHAN HOSPITAL

用藥指導單張

肛門栓劑
陰道栓劑

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院
藥劑科臨床藥學組製

【肛門栓劑】

- 1、手洗淨，將栓劑拆去外包裝，再用溫水沾潤。
- 2、仰躺後，用手指將栓劑由較圓滑的一端塞入肛門(約進去5公分或食指長度，幼兒約2-3公分)。
- 3、夾住兩臀，保持躺姿15分鐘。

【退燒栓劑】

※使用方法：

- 1、腋溫超過38.5°C (肛溫、耳溫>39.5°C)。
- 2、每次使用間隔至少6小時。


※注意事項：

- 1、使用後，如發生過敏或不適的現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並立即請教醫師或藥師。
- 2、本藥應置於小孩伸手不及之處，以免小孩誤服，造成危險。

【陰道栓劑】

- 1、栓劑請放冰箱(2-8°C)。
- 2、將指甲剪短，手洗淨，將外包裝拆去。(若自冰箱取出，可以先以溫水濕潤)。
- 3、仰臥曲膝，雙腿分開，以中指將藥儘量送入陰道深部(約兩個指節深)。
- 4、用藥時請勿行房事。
- 5、治療時期不可用刺激性肥皂清洗。
- 6、月經期中仍可繼續治療，不必中斷。使用生理護墊，不要使用棉條。但詳情請依醫師指示。
- 7、治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治。否則可能會復發。

【肛門栓劑圖示】



【陰道栓劑圖示】

