一、什麼是甲狀腺功能異常

- 懷孕期間血中濃度的游離甲狀腺及 甲狀腺刺激素機能的不平衡所合併 之甲狀腺疾病。
- 2. 懷孕婦女的甲狀腺功能異常時對母 親可能造成的危害有:妊娠高血 壓、鬱血性心臟衰竭、心房顫動、 甲狀腺風暴、自然流產、早產、胎 盤剝離、感染和貧血等。

二、症狀

1. 甲狀腺機能亢進:

不正常的心跳加速、正常食慾下體 重減輕、眼球凸出、雙手顫抖、冒 汗等。

2. 甲狀腺功能不足:


常見倦怠、全身無力、便秘、體重增加、肌肉酸痛或僵硬、等等。

三、護理指導

- 1. 甲狀腺機能亢進:
- (1)飲食宜減少含碘食物的攝取,例如海帶、海苔等。
- (2)規律的生活作息,避免情緒上的沖 擊刺激。
- (3)服藥按照醫師指示,不要擅自停 藥。
- (4)大部份低劑量的甲狀腺素可以控 制懷孕時的甲狀腺機能亢進。
- 2. 甲狀腺機能低下:
- (1)應依醫囑立刻藥物治療。
- (2)服藥同時仍須追蹤甲狀腺 Free T4及 TSH 檢驗數值。
- 3. 患甲狀腺毒症的孕婦所服用的抗甲 狀腺藥物皆可通過胎盤,而影響胎 兒的甲狀腺機能,但除非使用劑量 很高,否則其少因此導致胎兒甲狀

腺機能低下。

- 4. Propy1thiouracil【PTU】穿過胎盤的機會較少及少量會進入乳汁,哺乳後服藥或3-4hr再哺乳,而且較不會造成胎兒頭皮缺陷,所以在懷孕及哺乳的情形下比較適用PTU,但在整個懷孕過程中,準媽媽們必須要配合醫師定期監測體內的甲狀腺功能,以調整PTU至最低有效用量。
- 5. 孕婦如於懷孕前即已知有甲狀腺功能低下症,應先將甲狀腺恢復至成正常較為恰當。





妊 娠 併 甲 腺 病 護 理 指 導

如對術後護理指導有問題請洽詢 中山醫療社團法人中山醫院

地址:臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號

電話: (02)2708-1166

95.06 制, 114.07 檢

現代醫療,傳統照顧