## 一、什麼是子宮頸閉鎖不全

- 1.子宮頸閉鎖不全,是指子宮頸處於 擴張情形而無法鎖緊。如果在懷孕 時沒有處理,在妊娠的第二或第三 孕期早期(14到35週期間)會產 生無痛性子宮頸變薄和子宮頸內 口擴張,合併羊膜經由子宮頸脫 出,而像氣囊般進入陰道,然後羊 膜破裂造成胎兒早期排出。
- 子宮頸閉鎖不全的原因,主要是先 天性子宮頸發育異常和後天子宮 頸傷害。
- 3. 子宮頸閉鎖不全主要的治療方法 是在妊娠 14~16 周時施行子宮頸 環紮手術。



正常懷孕



異常:子宮頸打開.羊膜囊掉出



治療:縫合成功

## 二、症狀

陰道超音波檢查可以檢查子宮 頸長度與子宮頸口是否閉鎖不全,通 常在初次流產之後才能被診斷出來。

## 三、護理指導

1. 手術後建議住院,觀察是否有早產 陣痛的情形發生,如果手術後仍有 子宮收縮的狀況,依醫囑使用安胎 藥物。 圖:出自台北市私立東山高中曾美嘉

- 2. 陰道會有少量的點狀出血,傷口癒 合約3天左右。
- 3. 手術後應多休息。
- 4. 六週內避免激烈運動及搬提重物。
- 多攝取液體及蔬菜、水果,養成每 天排便習慣,以防便秘。

- 6. 有下列情况時請立即返院求診:
  - (1)陰道出血
  - (2)發燒
  - (3)腹部疼痛
  - (4)子宮收縮或破水等。
- 7. 請與醫師討論後才可恢復性生活。
- 8. 請依醫囑按時服藥及回院複診。
- 約36週或足月時請記得告訴醫師, 曾經做過子宮頸環紮手術,將縫線 切斷,便可以自然生產。



子宮頸閉鎖不全護理指導

如對護理指導有問題請洽詢 中山醫療社團法人中山醫院 地址:臺北市仁愛路四段112巷11號

電話: (02)2708-1166

95.06 制、114.07 檢

現代醫療,傳統照顧