一、什麼是子宮內膜異位症

子宮內膜組織會隨著卵巢週期 的變化,以經血的方式流出,若跑 到子宮外面的地方附著,長在卵巢 (稱為巧克力囊腫)或子宮肌層(稱 為子宮肌腺症),附著在骨盆腔會 造成沾黏,若在腸胃附近,月經週 期可能出現腹瀉、胃腸疼痛問題。




圖:出自台北市私立東山高中曾美嘉

二、子宮內膜異位症的症狀







②不孕



②性交疼痛 ②出血過多

圖:出自台北市私立東山高中曾美嘉

症狀與異位部位有關,常見有經痛、不孕和性交疼痛、月經前點 狀出血或經血量多、腸沾黏、脹氣、 腹瀉或便秘等。可經由內診、抽血 中 CA-125、 腹腔鏡、超音波檢查 確立診斷。治療方式包括荷爾蒙藥 物治療及手術療法,3公分以下的 囊腫,不一定要開刀,5公分以上 的囊腫則建議手術。

三、手術後護理指導

- 1. 術後 1-2 週有少許淡紅或紅褐 色分泌物屬正常,勿用衛生棉條 及陰道灌洗以避免感染,請大小 便後用溫水沖洗,保持會陰清潔 乾燥。
- 保持傷口乾燥,腹腔鏡手術要注 意臍部清潔,洗澡以淋浴為佳。
- 3. 多高蛋白、攝取高維生素、礦物 質食物以促進傷口修復;多吃高 纖蔬果及多飲水預防便秘;少量 多餐忌刺激性飲食,避免豆.奶. 地瓜等產氣食物。
- 術後6週以散步最佳,避免劇烈運動如腳踏車、跳舞、久坐以免骨盆充血;避免提重物增加腹壓造成傷口疼痛。

- 5. 術後 4-6 週經醫師檢查傷口癒 合良好,即可正常性生活,務必 採行避孕措施,計畫懷孕者請與 醫師討論。
- 6. 傷口偶有輕微抽痛情形乃正常 現象,傷口有紅、腫、熱、痛及 異常分泌物陰道鮮紅色或惡臭 分泌物、噁心嘔吐、腹痛、發燒 等現象需立即返院。
- 7. 採腹腔鏡手術後可能發生:容易 腹脹氣、肩膀或肩後背酸痛(為 手術時打二氧化碳氣體保護內 臟所造成的反射痛),約術後7 天會改善,可熱敷使肌肉鬆弛緩 解酸痛。
- 8. 依照醫師指示的療程繼續口服 或注射荷爾蒙藥物。





如對術後護理指導有問題請洽詢 中山醫療社團法人中山醫院 地址:臺北市仁愛路四段112巷11號

電話: (02)2708-1166

107.05 制、114.07 檢

宮 內 膜 異 位 症 術 護 理

現代醫療,傳統照顧