一、什麼是乳腺炎:

於哺餵期間種種因素或退奶未執 行完全,而導致乳房組織併有發炎現 象時,就會造成乳腺的發炎。常由金 黃色葡萄球菌引起。

二、症狀:

- 1. 乳房皮膚紅腫
- 2. 乳房有硬的腫塊、壓痛、脹痛
- 3. 高燒【38.5 度以上~40 度】
- 4. 全身疲倦不適症狀。




(圖片已經當事人同意)

三、護理指導:

- 排空乳汁可注意奶水是否通暢,
 如:寶寶含的不好、避免衣服/胸罩
 過緊、餵奶時手指勿壓到乳暈、乳
 房大而下垂時試著以手扥高乳房
 - 2. 可餵奶、多休息,不想餵患側時務 必每 2-3 小時將奶水擠出。
 - 3保持乳頭清潔乾燥,盡量將乳頭暴露於空氣中;避免使用溢奶墊。
 - 4. 清潔乳房時動作應輕柔,避免於乳 頭上使用肥皂。
 - 在觸摸乳房及哺餵母乳時要洗手及 穿支持性胸罩。
 - 6. 若有乳頭破裂或疼痛時,可用手來 (2 擠壓將乳房排空直到乳頭癒合為 止,(或用可調壓力的電動吸乳器) 不可用手動式的擠奶器來壓擠乳

- 頭,否則會使乳頭破裂更嚴重。
- 7. 預防乳頭破皮,避免造成乳腺炎, 方法如下:
- (1)嬰兒吸吮時能正確含住乳頭和乳 暈,注意勿讓嬰兒含乳頭睡著或 吸吮過久。



(圖片來源:國民健康局)

(2)從嬰兒嘴裡移出乳頭時,先利用手 指使嬰兒鬆開含住的乳頭,勿用 力將嬰兒與乳房拉開。

- (3)增加餵奶次數,避免嬰兒太餓而 用力的吸吮,也可以預防乳房腫 脹和乳汁滯留。
- (5)保持乳頭的柔軟與乾燥,勿過度 刺激乳頭,造成乳頭破裂。
- (6)更換餵奶的姿勢,可改變乳頭最 大受壓區,促進乳房完全排空。



乳腺炎護理指導

如對術後護理指導有問題請洽詢 中山醫療社團法人中山醫院

地址:臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號

電話: (02)2708-1166

95.06 制、114.07 檢

現代醫療, 傳統照顧