


一、引流液收集器傾倒方法及步驟

1. 洗手。
2. 打開引流液收集器蓋子（注意勿碰觸引流液收集器開口以避免感染）。



3. 將引流液倒入量杯。

4. 將引流液收集器壓扁並蓋回蓋子。



5. 記錄日期時間、引流量及顏色。



二、注意事項：

1. 請用夾子固定好引流管，並預留翻身或活動長度，以避免移位或滑脫。
2. 每日檢查引流管有無扭曲、受壓管內有無阻塞物，以維持引流管通暢。
3. 請保持傷口引流處清潔乾燥，並注意傷口有無紅、腫、熱、痛情況。
4. 請每日定時或引流液達收集器容量一半時，倒出引流液並記錄引流量。
5. 請回診時將記錄單提供給醫生，作為是否拔除引流管之參考。



三、有以下情形請立即返診：

1. 引流液突然增加、減少、變混濁、
有異味、無引流液或有大量鮮紅色
液體。
2. 引流管、引流液收集器有破損、斷
裂或不慎移位、滑脫。
3. 傷口紅、腫、熱、痛、膿樣分泌物
或體溫38°C以上時。
4. 傷口出現引流液滲出、紗布滲濕或
皮膚有發紅、腫脹感。

四、引流管拔除時機：

經醫師評估引流量及傷口癒合情
形，將於適當時機拔除引流管。

(以上圖片已經當事人同意)
如對護理指導有問題請洽詢
中山醫療社團法人中山醫院
地址：臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號
電話：(02)2708-1166

99.02 制、114.07 修

傷
口
引
流
管
護
理
指
導

現代醫療，傳統照顧