

一、什麼是臍帶感染：

於臍帶脫落之前或之後，因皮膚上菌落或腸道細菌引起的感染。

脫落後再用 75%的酒精消毒。

6. 不可用優碘或不明藥粉擦拭臍帶。

7. 臍帶脫落後繼續護理直到臍根部乾燥無分泌物為止，若有發紅、發臭、異常分泌物或持續出血應就醫。



二、症狀：

臍部有發炎、紅腫、臍窩會明顯的膨出、周圍皮膚會泛紅、嬰兒會有點不安，嚴重時會伴有發燒。

4. 臍帶不須特別包紮，但須保持清潔乾燥。


5. 尿布應摺到臍部之下，以免尿液回滲造成感染。

三、護理指導：

1. 新生兒出生後，臍帶的殘株會漸退化，(而)於(7-14 天)二至三星期後脫落。

2. 臍帶周圍若有淡黃分泌物無臭味，是正常現象。

3. 每次更換尿布時確實執行臍帶護理，先用 95% 酒精促進乾燥，臍帶





預防臍帶感染之護理指導

如對護理指導有問題請洽詢
中山醫療社團法人中山醫院
地址：臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號
電話：(02)2708-1166 # 2220
95.04 制、114.07 檢

現代醫療，傳統照顧