
一、什麼是腕隧道症候群?

手腕長期過度使用導致肌腱發炎,水 腫壓迫到手腕正中神經造成的症狀, 一般與工作及職業有關,如暴露於振 動的環境,如手握電鋸、鑿洞機,長 期使用電腦或需反覆行手部和腕部動 作。

二、症狀:

- (一)手掌及手指感覺異常,如:麻 木感、疼痛、燒灼或針刺感。
- (二)症狀可能會向上延伸至手臂上 端,夜間疼痛加劇。
- (三)嚴重會出現大拇指無法向外伸展 或肌肉萎縮、抓握力減弱。



圖片摘自網路

三、治療方式:

(一)保守治療:

初期症狀輕微,以多休息,配戴護腕、 復健等方式治療,避免手腕不當操 作;鼓勵多攝取富含維他命B群食物, 如:全穀類、瘦肉、豆類、牛奶、蔬菜 **等食物。**

(二)手術治療:

1. 保守治療無效或症狀加劇時,經 醫師評估建議手術治療。

四、手術後護理指導:

- (一)術後兩天患肢需高於心臟,睡覺 時以枕頭抬高,以減輕傷口腫脹,可 活動手指頭以增進血液循環。
- (二)手術後配戴護腕,術後24小時內 需注意是否有感覺異常,如麻木、針 刺感,請立即通知護理師。
- (三)術後傷口不需拆線,保持局部清潔 與乾燥。若傷口出現紅、腫、熱、痛 的情形, 應立即返診。
- (四)持續使用護腕約6週,勿提握超過2 公斤的重物。



腕隧道症候群護理指導

如對術後護理指導有問題請洽詢 中山醫療社團法人中山醫院

地址:臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號

電話: (02)2708-1166

107.05 制、114.07 檢

現代醫療,傳統照顧