

5



中山醫療社團法人中山醫院
CHUNG SHAN HOSPITAL

用藥指導單張

心絞痛藥物

舌下錠

成份	中文商品名 英文商品名	含量 mg/錠
Nitroglycerin	耐絞寧 舌下錠 Nitrostat	0.6mg

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院
藥劑科臨床藥學組製

【作用】

硝酸甘油可使全身血管擴張，降低心肌對氧需求，用於預防或緩解胸痛（心絞痛）。舌下錠作用時間快，用於解除心絞痛的急性症狀。

【服藥指示】

1. 當急性心絞痛(胸痛)發作時，使用 1 粒 Nitroglycerin 置於舌下或口腔中，不可吞服，使其溶化吸收；在症狀緩解前，每隔五分鐘使用一粒。若在 15 分鐘內服用 3 粒後仍舊疼痛，則應立即就醫，並告知醫師已使用過本藥。
2. 本品作為預防性使用時，則在從事可能引起心絞痛發作的活動前 5-10 分鐘服用。
3. 急性心絞痛發作時，最好休息並採取坐姿服用以避免因頭暈而跌倒。

【注意事項】

1.本藥為一種硝酸鹽類，與酒精同時服用時可能引起低血壓，應避免同時喝酒；若您有服用其他硝酸鹽類（威而剛是其中一種）或降血壓藥時都應告訴您的醫師，有可能要分開服用或

或調整劑量，讓您的醫師來決定該如何服用，避免有過強的降壓效果。

2.每次開瓶取藥時，請避免倒出過多藥粒或置於掌中過久再倒回藥罐以免藥物受潮而降低藥效；取藥後請儘速將瓶蓋扭緊。

3.使用本藥時應採站姿或坐姿以達最大藥效，因藥效發揮時患者極可能會發生輕微頭痛、暈眩等反應，故建議患者用藥時應儘可能採取坐姿，若您已採取坐姿但仍感暈眩時，可深呼吸數次後將身體前傾並將頭置放於兩膝間以緩解不適。

4.用藥後 5~10 分鐘內請勿進食、飲酒或抽煙。

5.本藥可能引起頭暈，從事危險性工作（如開車、操作機械）時應小心。

6.本藥放久可能失效，請隨時注意藥品的有效期限。可在瓶身所註明之有效期間內保持其藥效。（開封後 3 個月內有效）。

7.本藥應置於原棕色容器內以避光，將瓶蓋蓋緊，儲存於乾燥室溫環境中。

8.嚴重貧血、顱內壓升高和對 Nitroglycerin 或其他 Nitrates 過敏之患者不適合使用本藥。

【藥物相關之副作用及建議處置】

1. 若您於服藥期間發生下述狀況時請立即回診就醫：過敏反應：如皮疹、蕁麻疹、嘴部或喉嚨有刺痛或腫脹感、呼吸困難。嘴唇或指甲出現藍色；意識不清、視力模糊、口乾、胸痛加劇或心跳減慢。
2. 若您於服藥期間發生下述狀況時請告知您的醫師：持續出現臉部潮紅、噁心、嘔吐或等現象時，請儘快聯絡您的藥師、醫師或儘快回診。

【藥品儲存指示】

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。