

用藥指導單張

口服降血糖藥物

Thiazolidinedione

成份	中文商品名 英文商品名	含量 mg/錠
Pioglitazone	愛妥糖 Actos	30

Non-Sulfonylurea

Repaglinide	諾和隆錠 NovoNorm	1
-------------	------------------	---

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院
藥劑科臨床藥學組製

【作用】

Thiazolidinedione 類：幫助你的身體有效利用胰島素。

NovoNorm：使胰臟產生更多的胰島素來控制血糖

【服藥指示】

1. 糖尿病無法根治，但高血糖會引起腎臟，眼睛及心血管病變；故需要長期良好的控制，請按照醫師指示服藥，不可因為沒有不舒服的症狀而自行停藥
2. 儘可能保持每日於相同時間服用。

【忘記服藥時該怎麼辦？】

請儘快補服；但若已很接近下次的服藥時間時，請在下次正確服藥時間再服藥；請注意：切勿在同一時間或短時間內重複服用兩次劑量！！

【注意事項】

1. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量，檢查血糖、糖化血紅素及尿糖。

2. 服藥期間飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食、飲酒、或過度運動會引起低血糖。
3. 服用本藥前有下列事項請告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病（心衰竭、肝疾病）或同時服用其他藥物，讓醫師決定是否應用藥。
4. 當感冒或發燒時，應正常服用本藥，若無法進食，應以純果汁 200cc 代替一餐，以避免低血糖。
5. 若您目前正在服用其他的藥品(包括其他醫師開立之藥物、成藥或保健食品)，亦請您先告知醫師。

【藥物相關之副作用及建議處置】

1. 若有以下**高血糖**症狀：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、身體虛弱、呼吸困難、心跳加快、皮膚乾燥、反應遲鈍，請立刻聯絡您的醫師以調整劑量或飲食。
2. 若有以下**低血糖**症狀：不尋常的飢餓感、無力感、顫抖、心跳加快、冒冷汗、視力模糊、精神意志不易集中，，應立刻補充

果汁 200cc 或糖果 2-4 顆。如未見改善，則應送急診。

3. 嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，則不可進食應立即送急診。
4. 高低血糖症狀有時不易分辨，可先測血糖再決定是否需要補充果汁或糖果。若常有高低血糖發生，請告知你的醫師。
5. 若您於服用 Thiazolidinedione 類藥物期間發生下述狀況時請立即回診就醫：尿液顏色變黑、皮膚及眼白變黃、胃痛且噁心嘔吐無食慾、呼吸困難
6. 若您於服用 NovoNorm 期間發生下述狀況時請立即回診就醫：胸痛

【藥品儲存指示】

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。